Formule di Trigonometria

formule di Briggs



dato un triangolo qualsiasi di cui siano note le misure dei lati **a**, **b**, **c** e il **semiperimetro p**, i seni, i coseni, le tangenti e le cotangenti delle semiampiezze degli angoli sono espresse dalle seguenti relazioni:

$$sen\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}} \qquad cos\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}} \qquad tg\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{p(p-a)}} \qquad ctg\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{p(p-a)}{(p-b)(p-c)}}$$

$$sen\frac{\beta}{2}=\sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{ac}} \qquad cos\frac{\beta}{2}=\sqrt{\frac{p(p-b)}{ac}} \qquad tg\frac{\beta}{2}=\sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{p(p-b)}} \qquad ctg\frac{\beta}{2}=\sqrt{\frac{p(p-b)}{(p-a)(p-c)}}$$

$$sen\frac{\gamma}{2}=\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}} \qquad cos\frac{\gamma}{2}=\sqrt{\frac{p(p-c)}{ab}} \qquad tg\frac{\gamma}{2}=\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{p(p-c)}} \qquad ctg\frac{\gamma}{2}=\sqrt{\frac{p(p-c)}{(p-a)(p-b)}}$$

formula di Erone



l'area di un triangolo qualsiasi si esprime in funzione delle lunghezze dei lati **a, b, c** e del **semiperimetro p** come:

$$\mathcal{A}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

teorema delle tangenti o di Nepero



$$\frac{a+b}{a-b}=\frac{tg\frac{\alpha+\beta}{2}}{tg\frac{\alpha-\beta}{2}}$$

$$\frac{a+c}{a-c}=\frac{tg\frac{\alpha+\gamma}{2}}{tg\frac{\alpha-\gamma}{2}} \qquad \frac{b+c}{b-c}=\frac{tg\frac{\beta+\gamma}{2}}{tg\frac{\beta-\gamma}{2}}$$

applicazioni della trigonometria alla geometria analitica



significato del coefficiente angolare m di una retta di equazione in forma esplicita $y=mx+q$

$$m=tg\alpha$$



tangente dell'angolo formato da due rette r ed s di coefficiente angolare m_r ed m_s

$$tg\alpha=\frac{m_r-m_s}{1+m_r m_s}$$

se α è **acuto** la tangente è **positiva**
se α è **ottuso** la tangente è **negativa**

© 2012 - www.matematika.it

Formule di Trigonometria

applicazioni della trigonometria alla geometria



raggio R della circonferenza circoscritta ad un triangolo

$$R = \frac{a}{2sen\alpha} = \frac{b}{2sen\beta} = \frac{c}{2sen\gamma}$$

oppure $R = \frac{abc}{4\mathcal{A}}$ $\mathcal{A}$ = area del cerchio



raggio r della circonferenza inscritta in un triangolo

$$r = (p-a)tg\frac{\alpha}{2} = (p-b)tg\frac{\beta}{2} = (p-c)tg\frac{\gamma}{2}$$

oppure $r = \frac{\mathcal{A}}{p}$ $\mathcal{A}$ = area del cerchio

p = **semiperimetro** del triangolo



raggio delle circonferenze ex-inscritte ad un triangolo
(cioè tangenti a un suo lato e ai prolungamenti degli altri due)

$r_a = p\ tg\frac{\alpha}{2}$ oppure $r_a = \frac{\mathcal{A}}{p-a}$

$r_b = p\ tg\frac{\beta}{2}$ oppure $r_b = \frac{\mathcal{A}}{p-b}$

$r_c = p\ tg\frac{\gamma}{2}$ oppure $r_c = \frac{\mathcal{A}}{p-c}$

$\mathcal{A}$ = area del cerchio p = **semiperimetro** del triangolo



mediane di un triangolo

$$m_a = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$$

$$m_b = \frac{1}{2}\sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}$$

$$m_c = \frac{1}{2}\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}$$



bisettrici di un triangolo

$$b_\alpha = \frac{2bc\ \cos\frac{\alpha}{2}}{b+c}$$

$$b_\beta = \frac{2ac\ \cos\frac{\beta}{2}}{a+c}$$

$$b_\gamma = \frac{2ab\ \cos\frac{\gamma}{2}}{a+b}$$

area di un parallelogramma



$$\mathcal{A} = ab\ sen\alpha$$

area di un quadrilatero



$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}\ d_1 d_2\ sen\alpha$$

© 2012 - www.matematika.it